



# FERNOR



## Obtention INRA : Franquette x Lara®

Observations issues des vergers de la Station de Creysse


### Date des principaux stades phénologiques :

Variété	Débourrement (Cf moyen)	Pleine floraison mâle (Fm <sub>2</sub> moyen)	Pleine floraison femelle (Ff <sub>2</sub> moyen)
Ferjean	08 avr	27 avr	02 mai
Lara	08 avr	23 avr	05 mai
<b>Fernor</b>	<b>21 avr</b>	<b>01 mai</b>	<b>12 mai</b>
Franquette	21 avr	01 mai	13 mai
Fernette	22 avr	03 mai	14 mai

**L'arbre** : port érigé et vigueur moyenne mais inférieure à Franquette

**Maladies** : sensibilité à la bactériose et à l'antracnose moyenne

**Production et qualité des noix** : maturité du fruit tardive, similaire à Franquette



Variétés	Calibres (en % du poids sec)			Qualité cerneau		
	< 30 mm	> 32 mm	> 34 mm	Rdt cassage	Extra	Déchets
Ferjean	13,1%	66,6%	27,3%	46,9%	83,5%	4,8%
Fernette	2,9%	91,9%	74,2%	45,9%	84,8%	4,6%
<b>Fernor</b>	<b>11,5%</b>	<b>67,5%</b>	<b>32,5%</b>	<b>42,9%</b>	<b>92,3%</b>	<b>2,9%</b>
Lara	1,7%	94,8%	81,2%	43,8%	82,4%	5,1%
Franquette	12,3%	65,6%	23,8%	44,0%	82,0%	2,6%

- Points forts :**
- Débourrement tardif
  - Par rapport à Franquette, mise a fruit plus rapide et productivité du verger supérieure
  - Bonne qualité de la noix et du cerneau

- Points faibles :**
- Fernor est à cultiver de préférence sur des sols riches
  - Vigueur moyenne impliquant une taille régulière
  - Envoisage plus difficile que Franquette