


**Date des principaux stades phénologiques :**

Variété	Débourrement (Cf moyen)	Pleine floraison mâle (Fm <sub>2</sub> moyen)	Pleine floraison femelle (Ff <sub>2</sub> moyen)
Ferjean	08 avr	27 avr	02 mai
Lara	08 avr	23 avr	05 mai
Fernor	21 avr	01 mai	12 mai
Franquette	21 avr	01 mai	13 mai
<b>Fernette</b>	<b>22 avr</b>	<b>03 mai</b>	<b>14 mai</b>

**L'arbre :** port semi-érigé à semi-étalé et vigueur moyenne

**Maladies :** sensibilité à la bactériose et à l'antracnose assez faible

**Production et qualité des noix :** maturité du fruit tardive, similaire à Franquette



Variétés	Calibres (en % du poids sec)			Qualité cerneau		
	< 30 mm	> 32 mm	> 34 mm	Rdt cassage	Extra	Déchets
Ferjean	13,1%	66,6%	27,3%	46,9%	83,5%	4,8%
<b>Fernette</b>	<b>2,9%</b>	<b>91,9%</b>	<b>74,2%</b>	<b>45,9%</b>	<b>84,8%</b>	<b>4,6%</b>
Fernor	11,5%	67,5%	32,5%	42,9%	92,3%	2,9%
Lara	1,7%	94,8%	81,2%	43,8%	82,4%	5,1%
Franquette	12,3%	65,6%	23,8%	44,0%	82,0%	2,6%

- Points forts :**
- Très bonne floribondité mâle : bon pollinisateur pour Lara® et l'ensemble des variétés précoces
  - Débourrement tardif et tolérance à la bactériose
  - Par rapport à Franquette, mise à fruit plus rapide et productivité du verger supérieure
  - Bon calibre des fruits

- Points faibles :**
- Mauvaise lignification des coques constatée sur certains types de sol
  - Vigueur moyenne nécessitant des sols riches et une taille régulière