

## Obtention INRA : Adam's 10 x Chandler

Observations issues du verger d'évaluation niveau 1 de la Station de Creysse


### Date des principaux stades phénologiques :

Variété	Débourrement (Cf moyen)	Pleine floraison mâle (Fm <sub>2</sub> moyen)	Pleine floraison femelle (Ff <sub>2</sub> moyen)
<b>Feradam</b>	<b>02-avr</b>	<b>27-avr</b>	<b>11-mai</b>
Ferouette	01-avr	26-avr	11-mai
Ferbel	31-mars	26-avr	12-mai

**L'arbre** : vigueur faible, port étalé avec départs de branches à angles ouverts et rameaux trapus

**Maladies** : sensibilité à la bactériose et à l'antracnose moyenne à forte sur feuilles et fruits

**Production et qualité des noix** : maturité du fruit proche de Lara<sup>®</sup>



Variété	Calibres (en % du poids sec)		Qualité cerneau		
	< 32 mm	> 34 mm	Rdt cassage	Extra	Déchets
<b>Feradam</b>	<b>3,4%</b>	<b>84,8%</b>	<b>44,6%</b>	<b>71,8%</b>	<b>5,2%</b>
Ferouette	3,2%	74,3%	49,6%	98,0%	4,2%
Ferbel	10,7%	57,5%	45,8%	89,2%	1,0%



**Points forts** : • Très bon calibre → intérêt pour le marché de la noix en coque

**Points faibles** : • Débourrement précoce ; arbre très peu vigoureux et développement faible  
 • Départs de branches à angles ouverts et mise à fruits rapide impliquant la nécessité de tuteurer les arbres pendant la formation afin d'éviter la casse au niveau de l'axe  
 • Positionnement des noix favorable aux coups de soleil sur fruits  
 • Goût du cerneau assez fade